

37. Bukkal (Ağız içi) İlaç Uygulaması

Tanımlar

İlacın yanak ile diş eti arasına yerleştirilerek, tamamen eriyene kadar ilacın emilmesidir.

Amaç

Ağızda emilerek alınması gereken ilaçların güvenli bir şekilde alınmasını sağlamaktadır.

Uygulama Basamakları

- ✓ İlacın verileceği hasta kimliği ve ilaç saati kontrol edilir
- ✓ İlaç dolabının yanına gelinir ve ilaç tepsisi masanın üzerine konur
- ✓ Eller yıkanarak eldiven giyilir
- ✓ İlaç kartlarından oda ve yatak numarası sırasına göre ilk hastanınki alınır
- ✓ Tepsi ile hasta yanına gidildikten sonra hastanın kimliği, ismi ile hitap edilerek, isim bilekliğine bakılarak ya da hasta tabelasından kontrol edilir
- ✓ İlk kart üzerinde yazılı ilacın adı, dozu kontrol edilir
- ✓ İlaç, ilaç dolabından ya da ilaç kutusunda hastaya ayrılmış gözden alınır
- ✓ İlaç kutusunun üzeri ve kart iyice okunarak tekrar kontrol edilir
- ✓ Verilecek dozda ilaç alınır ve ilaç kadehinin içine konur
- ✓ İlaç tekrar üzeri okunarak yerine kaldırılır

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- ✓ Hasta, ilacı ağızına aldığı anda çiğnememeli, yutmamalı, sıvı almamalı ve nikotin vazokonstriksiyona neden olduğundan sigara içmemelidir
- ✓ Erken komplikasyonlar açısından hasta takip edilmelidir

Kullanılan Araç ve Gereçler

- ✓ Tepsi içinde, temiz ve kuru bir şekilde ilaç kadehleri
- ✓ Su bardağı veya emzikli bardak
- ✓ İçinde su bulunan kadehte damlalık
- ✓ İlaç kartları
- ✓ Ölçülü kaşık
- ✓ Gerektiğinde şişeyi silmek için ıslak bir bez veya gazlı bez
- ✓ Böbrek küvet

İşin Riskleri

Hastada Oluşabilecek Riskler

- ✓ İlacın hava yoluna kaçma riski
- ✓ Alerji gelişme riski
- ✓ Yanlış ilaç içme riski

Çalışanda Oluşabilecek Riskler

- ✓ Hastalık bulaşma riski